

Lövängen

Lövängen är en kvarleva från det äldre jordbrukslandskapet som präglade stora delar av vårt land förr i tiden. Under hundratals år har människans slit med lie, räfsa, lövkniv och yxa skapat den här mycket artrika miljön. De små rester av lövängar som återstår vårdas idag för att gynna ängens mångfald av växter och djur.

Fodermark. Ängar har traditionellt använts för skörd av vinterfoder. Gräs och örter slogs med lie och torkades till hö. Efter slåttern kunde djuren släppas ut i ängen på bete. Glest stående träd och buskar var vanligt i många ängar och höet drygades ofta ut med löv och kvistar. Sådan lövtäkt kallas hamling. I det gamla jordbrukssamhället upptog ängsmarken stora arealer – långt mycket större än arealen åker.

Ogödslad mosaik. Ängsmarker med hamlade lövträd och buskar kallas för lövängar. I lövängen finns en mosaik av öppna gräsytor och slutna lövskogsdungar. Marken är ofta ogödslad och har normalt inte plöjts eller såtts i någon större utsträckning. Hamlade träd i olika åldrar, hassel och blommande träd och buskar är vanliga inslag i den

typiska lövängen. Ofta hittar man också döda träd, nerfallna grenar och annan död ved.

Lövängens mångfald. I lövängen finns en enastående mångfald av växter och djur. Ängens växter är välkända och många – på en kvadratmeter ängsmark kan det finnas över fyrtio olika växter. Mindre kända är alla de svampar som hör hemma i traditionellt skötta ängar. I blomster-ängen finns också ett myller av fjärilar, bin och humlor. Lövängens brynmiljöer erbjuder både vindskydd och mat åt nektar- och pollenätande insekter. En rik mångfald av arter är också knutna till lövängens gamla lövträd, som erbjuder håligheter för insekter, fåglar och fladdermöss, och växtplatser för arter som trivs i lite skuggigare miljöer med högre luftfuktighet, till exempel lunglav.



ekticka
Fomitiporia robusta



brun guldbagge
Protaetia marmorata



lunglav
Lobaria pulmonaria



nordfladdermus
Eptesicus nilssonii



slätterfibbla
Hypochaeris maculata



darrgräs
Briza media



Sankt Pers nycklar
Orchis mascula



sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena filipendulae

scharlakansvaxskivling
Hygrocybe punicea

Ängen är en artrik naturtyp – inte minst när det kommer till blommor och gräs. Mångfalden är beroende av människans brukande eller skötsel – utan den skulle artrikedomen snabbt utarmas.



The wooded meadow

Wooded meadows have traditionally been used for harvesting winter fodder. Grass and herbs were cut with a scythe and dried to make hay, which was mixed with leaves and twigs from the deciduous trees in the meadows. Meadow lands occupied a lot of space in old agricultural communities – in fact, much more area than fields. Wooded meadows contain a marvellous diversity of plants and animals. There can be over 40 species of plants and a wealth of butterflies and bees in just one square metre of unfertilised, traditionally managed meadow land. A rich diversity of species are also linked to the mature deciduous trees in wooded meadows.

Denna skylt är producerad med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens Life-program. Innehållet ansvarar projektet Life RestoRED för. Det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens uppfattning.

